Erythrina falcata Benth.

(bico de papagaio, bico de pato, ceibo, corticeira, suinã)

Família: Fabaceae

Endêmica: não²

Bioma/Fitofisionomia: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica²

Recomendação de uso: Silvicultura

A madeira da corticeira, por apresentar baixa resistência mecânica é pouco utilizada no Brasil. Geralmente é usada para móveis rústicos, obras internas, pranchões, tacos e cepas para calçados. As rolhas, extraídas da casca, apresentam propriedades elétricas e caloríficas. A madeira possui densidade 0,32 g/cm³ e baixa durabilidade quando exposta. A planta é extremamente ornamental, com flores muito chamativas. Ocorre em altitudes entre 500 - 900.

Etnobotânica e Histórico

Usos específicos: produtos madeireiros (brinquedos, caixotaria, gamelas, mourões, objetos ortopédicos, solados de sapato, celulose e papel, forro e teto, janelas e venezianas, tabuados, tacos), produtos não madeireiros (medicinal, ornamental, alcalóides)^{1,9}

Características gerais

Porte: altura 10.0-35.0m DAP 30-100cm^{7,1}

Cor da floração: vermelha¹

Velocidade de desenvolvimento: Lenta¹

O crescimento da corticeira é lento e muito irregular.

Persistência foliar: Decídua¹

Sistema radicular: -

Formato da copa: -

Diâmetro da copa: -

Alinhamento do tronco: Reto¹

Superfície do tronco: Fissurada¹

Tipo de fruto: Seco deiscente (Legume)^{3,4}

Cuidados

Poda de condução e de galhos: sim¹

Pragas e doenças: Entre as principais pragas que atacam a corticeira, destacam-se a broca das sementes que, na árvore, destrói grande parte da safra, e *Hypsipyla* sp. que seca os ponteiros.¹

Acúleos ou espinhos: -

Princípios tóxicos ou alergênicos: -

Drenagem do terreno: Áreas encharcadas/alagadas⁹

Planta seletiva higrófila, característica de várzeas aluviais muito úmidas.

Ecologia e Reprodução

Categoria sucessiona: Secundária inicial^{5,8}

Polinizadores: Beija Flor, papagaios e periquitos.³

Período de floração: julho a outubro¹

Tipo de dispersão: Anemocórica, Zoocórica^{3,5,1}

Agentes dispersores: -

Período de frutificação: dezembro a abril¹

Associação simbiótica com raízes: -

Produção de mudas

Obtenção de sementes: -

Os frutos devem ser coletados quando passam da coloração verde para marrom-escuro. A extração das sementes é feita manualmente, após a deiscência das vagens.

Tipo de semente: Não classificada^{5,6,1}

Tratamento para germinação: Tratamento térmico, Imersão em água, Tratamentos combinados^{5,1}

Em geral, não apresenta dormência. No entanto, a imersão é recomendada em água fria por 48 horas, para embebição (CARVALHO, 2003). Imersão em água a temperatura de 80°C, mantendo as sementes na água até que atinja a temperatura ambiente por mais de 24 horas, outra alternativa é a imersão das sementes em água a temperatura ambiente por 48 horas (MORI et al., 2012).

Produção de mudas: Canteiros ou Recipientes individuais¹

Recomenda-se semear duas sementes em sacos de polietileno com dimensões mínimas de 20 cm de altura e 7 cm de diâmetro, ou em tubetes de polipropileno de tamanho médio. A repicagem, se necessária pode ser feita uma a duas semanas após a germinação.

Tempo de germinação: 7 a 130 dias¹

Taxa de germinação: 70 a 95%^{1,5}

Número de sementes por peso: 6000/kg⁵

Exigência em luminosidade: Exigente em luz¹

Segundo CARVALHO 2003, tolera sombreamento de intensidade baixa a moderada. Não tolera baixas temperaturas, nos dois primeiros anos. Em florestas naturais, árvores adultas toleram temperaturas mínimas de até 8°C.

Dados madeireiros

Possui curva de incremento médio anual (IMA): -

Possui curva de incremento corrente anual (ICA): -

Bibliografia

¹ CARVALHO, P. E. R. Espécies arbóreas brasileiras. 1. ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2003. v. 1, 1039 p.

² LIMA, H. C. de. Erythrina. In: Lista de Espécies da Flora do Brasil. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: . Acesso em: 19 ago. 2013.

³ MORELLATO, L. P. C. Estudo da fenologia de árvores, arbustos e lianas de uma floresta semidecídua no sudeste do Brasil. 1991. 176 f. Tese (Doutorado em Biologia) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 1991.

⁴ LONGHI, R. A. Livro das árvores: árvores e arvoretas do Sul. Porto Alegre: L & PM, 1995. 176 p.

⁵ MORI, E. S.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; FREITAS, N. P.; MARTINS, R. B. Sementes florestais: guia para germinação de 100 espécies nativas. São Paulo: Instituto Refloresta, 2012. 159 p.

⁶ CARVALHO, L. R. de; SILVA, E. A. A. da; DAVIDE, A. C. Classificação de sementes florestais quanto ao comportamento no armazenamento. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 28, n. 2, p. 15-25, 2006.

⁷ BACKES, P.; IRGANG, B. Mata Atlântica: as árvores e a paisagem. Porto Alegre: Paisagem do Sul, 2004. 396p.

⁸ HARDT, E.; PEREIRA-SILVA, E. F. L.; ZAKIA, M. J. B.; LIMA, W. P. Plantios de restauração de matas ciliares em minerações de areia da Bacia do Rio Corumbataí: eficácia na recuperação da biodiversidade. Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 70, p. 107-123, abr. 2006.

⁹ LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil. 4 ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. v.1, 368 p.