

Ficus citrifolia Mill.

(figueira)

Família: Moraceae

Endêmica: não⁴

Bioma/Fitofisionomia: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica⁴

Recomendação de uso: Restauração

A figueira é uma árvore que pode alcançar até 10 metros de altura. Possui uma copa ampla e arredondada, seu tronco é sinuoso e possui casca lisa. Suas flores são brancas ou rosadas e seus frutos, mais conhecidos como figos, são consumidos por morcegos e pássaros.

Etnobotânica e Histórico

Usos específicos: -

Características gerais

Porte: altura 3.0-25.0m^{1,6,2}

Cor da floração: branca¹

Branças a rosadas.

Velocidade de desenvolvimento: -

Persistência foliar: Decídua²

Sistema radicular: -

Formato da copa: Globosa²

Diâmetro da copa: -

Alinhamento do tronco: Reto²

Superfície do tronco: Lisa¹

Tipo de fruto: Infrutescência (Sicônio)²

Cuidados

Poda de condução e de galhos: -

Pragas e doenças: -

Acúleos ou espinhos: -

Princípios tóxicos ou alergênicos: -

Drenagem do terreno: -

Ecologia e Reprodução

Categoria sucessional: -

Polinizadores: Abelhas (YAMAMOTO et al., 2007); vespas de figo (gênero Pegoscapus) (NAZARENO et al., 2007; CEREZINI, 2011).^{7,6,8}

Período de floração: -

Tipo de dispersão: Zoocórica^{5,3,7}

Agentes dispersores: Suas sementes são dispersas por aves e morcegos.³

Período de frutificação: outubro a dezembro⁵

Associação simbiótica com raízes: -

Produção de mudas

Obtenção de sementes: -

Tipo de semente: -

Tratamento para germinação: -

Produção de mudas: -

Tempo de germinação: -

Taxa de germinação: -

Número de sementes por peso: -

Exigência em luminosidade: Exigente em luz⁶

Bibliografia

¹ GONZÁLEZ-CASTAÑEDA, N.; CORNEJO-TENORIO, G.; IBARRA-MANRIQUEZ, G. El género Ficus (Moraceae) en la provincia biogeográfica de la Depresión del Balsas, México. Boletín de la Sociedad Botánica de México, n. 87, p. 105-124,

² DURÁN-RAMÍREZ, C. A.; FONSECA-JUÁREZ, R. M.; IBARRA-MANRÍQUEZ, G. Estudio florístico de Ficus (Moraceae) em el estado de Guerrero, México. *Revista mexicana de Biodiversidad*, Ciudad del México v. 81, p. 239-262, 2010.

³ LAPATE, M. E. Frugivoria de Ficus (Moraceae) por aves em figueiras em paisagens com diferentes níveis de fragmentação florestal no Estado de São Paulo. 2009. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009.

⁴ ROMANIUC NETO, S.; CARAUTA, J. P. P.; VIANNA FILHO, M. D. M.; PEREIRA, R. A. S.; RIBEIRO, J. E. L. da S.; MACHADO, A. F. P.; SANTOS, A. dos; PELISSARI, G.; PEDERNEIRAS, L. C. Moraceae. In: *Lista de Espécies da Flora do Brasil*. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: . Acesso em: 16 mai. 2013.

⁵ ATHIÊ, S.; DIAS, M. M. Frugivoria por aves em um mosaico de floresta estacional semidecidual e reflorestamento misto em Rio Claro, São Paulo, Brasil. *Acta Botanica Brasilica*, Feira de Santana, v. 26, n. 1, p. 84-93, 2012.

⁶ CEREZINI, M. T. Efeito da fragmentação florestal no estado de São Paulo sobre o mutualismo *Ficus citrifolia* P. Miller e vespas de figo. 2011. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências, Entomologia) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2011.

⁷ YAMAMOTO, L. F.; KINOSHITA, L. S.; MARTINS, F. R. Síndromes de polinização e de dispersão em fragmentos da floresta estacional semidecidual montana, SP, Brasil. *Acta Botanica Brasilica*, Feira de Santana, v. 21, n. 3, p. 553-573, 2007.

⁸ NAZARENO, A. G.; SILVA, R. B. Q. da; PEREIRA, R. A. S. Fauna de Hymenoptera em *Ficus* spp. (Moraceae) na Amazônia Central, Brasil. *Iheringia, Série Zoologia*, Porto Alegre, v. 97, n. 4, p. 441-446, dez. 2007.